

Крок М Сестринська справа

3.2 Медсестринство в інших дисциплінах хірургічного профілю

1

До очного центру звернувся пацієнт з травмою лівого ока. Лікар встановив діагноз - проникаюче поранення лівого ока. Яку пов'язку накладе медична сестра?

- A** *Асептичну бінокулярну
- B** Асептичну монокулярну
- C** Колову
- D** Монокулярну лейкопластирну
- E** Косинкову

2

До травмпункту звернувся пацієнт, у якого різана рана гомілки. Після проведення ПХО рани лікар призначив щеплення проти правцю. Яку потенційну проблему попередив лікар?

- A** *Захворювання на правець
- B** Виникнення сепсису
- C** Захворювання на сказ
- D** Виникнення тромбозу
- E** Захворювання на бешиху

3

Пацієнтка звернулася до мамолога зі скаргами на наявність новоутворення в молочній залозі. Який метод з перелічених встановлює діагноз злоякісної пухлини?

- A** *Цитологічне дослідження
- B** Ендоскопічне обстеження
- C** Ехографія
- D** Комп'ютерна томографія
- E** Лабораторні дослідження

4

У пацієнта 50 років лімфогранулематоз. Проходить курс хіміотерапії. Скаржитися медичній сестрі на безсоння, головний біль, нудоту, блювання. Яка її тактика в даній ситуації?

- A** *Повідомити лікаря
- B** Дати протиблювотне
- C** Запропонувати снодійне
- D** Порекомендувати дотримуватися дієти
- E** Застосувати знеболювальне

5

Пацієнт 63 років викликав швидку допомогу у зв'язку зі скаргами на сильний різкий біль у поперековій ділянці справа з іррадіацією в зовнішні статеві органи, часте болісне сечовиділення. З анамнезу: хворіє на нирковокам'яну хворобу. Яке незалежно сестринське втручання виконає медсестра?

- A** *Тепла грілка на поперекову ділянку
- B** Зігрівальний компрес
- C** Банки
- D** Міхур з льодом
- E** Гірчичники

6

Пацієнт 70 років звернувся до лікаря зі скаргами на часте сечовиділення вночі, часті

термінові позиви, утруднення при сечовиділенні. Після обстеження лікар встановив діагноз: “Аденома передміхурової залози II-A”. Яка пріоритетна потенційна проблема може виникнути у пацієнта?

- A** *Гостра затримка сечі
- B** Нетримання сечі
- C** Зміна кольору сечі
- D** Розлади діурезу
- E** Хронічна ниркова недостатність

7

У пацієнта рак легень. Раптово під час кашлю з'явилося кровохаркання. Яке незалежне втручання виконає медична сестра?

- A** *Покласти міхур з льодом на грудну клітку
- B** Покласти гірчичники на грудну клітку
- C** Поставити банки
- D** Зробити масаж грудної клітки
- E** Зігріваючий компрес

8

Медична сестра супроводжує пацієнта на рентгенологічне дослідження шлунку. Діагностовано - рак. Пацієнт запитує про результати дослідження. Що відповідь пацієнту медична сестра?

- A** *Порадить звернутися до лікаря
- B** Скаже справжній діагноз
- C** Промовчить
- D** Заспокоїть хворого
- E** Скаже неправдивий діагноз

9

Хворий у коматозному стані, дихає через трахеостому. Чергова медсестра реанімаційного відділення помітила, що дихання в нього стало частішим, з'явився ціаноз шкіри. Яке незалежне втручання може виконати медична сестра?

- A** *Перевірити прохідність трахеостомічної трубки
- B** Ввести спазмолітики
- C** Попередити западання язика
- D** Ввести серцеві засоби
- E** Налогодити інгаляцію зволоженого кисню

10

Яка проблема може виникнути при видаленні сірчаної пробки із зовнішнього слухового ходу методом промивання?

- A** *Втрата рівноваги
- B** Отогенний сепсис
- C** Отогенний менінгіт
- D** Абсцес мозку та мозочка
- E** Синустромбоз

11

У хворої 42 років виставлено діагноз: рак молочної залози III стадії. Який основний метод лікування?

- A** *Комплексний
- B** Хірургічний

- C* Хіміотерапія
- D* Гормонотерапія
- E* Променевий

12

До медичної сестри хірургічного кабінету звернулась сусідка зі скаргами на локальний біль в ділянці шлунка. З часом біль став інтенсивним. Медична сестра, при проведенні сестринського обстеження хворої, виявила додаткові скарги на нудоту, зниження апетиту та схуднення. Що порекомендує медична сестра пацієнтці?

- A* *Негайно звернутися до онколога або хірурга
- B* Вживати знеболюючі засоби
- C* Вживати таблетки церукалу
- D* Дотримуватися дієти
- E* Пройти ультразвукове обстеження шлунка

13

Чоловік звернувся до лікувального закладу зі скаргами на болючу припухлість верхньої повіки лівого ока. Об'єктивно: на обмежаній ділянці краю верхньої повіки, припухлість, яка має жовтуватий колір, на вершині пустула, по периферії гіперемія, набряк. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A* *Ячмінь
- B* Халязіон
- C* Абсцес
- D* Флегмона
- E* Алергічний набряк

14

Ви медична сестра урологічного відділення. Лікарем призначено провести промивання сечового міхура. Який антисептичний розчин необхідно підготувати?

- A* *Розчин фурациліну 1:5000
- B* 0,9% розчин хлориду натрію
- C* 3% розчин перекису водню
- D* 0,9% розчин хлориду натрію
- E* 0,9% розчин натрію гідрокарбонату

15

Серцево-легеневу реанімацію застосовують при термінальних станах, вкажіть один з них:

- A* *Клінічна смерть
- B* Агонія
- C* Предагонія
- D* Післяопераційний період
- E* "Соціальна смерть"

16

Ускладнення виразкової хвороби шлунку, що потребує негайної операції:

- A* *Перфорація виразки
- B* Субкомпенсований стеноз
- C* Некомпенсований стеноз
- D* Пенетрація виразки
- E* Шлунково-кишкова кровотеча

17

В анамнезі рана в ділянці стопи. Рана загоїлася, через деякий час у хворого виникло посмикування жувальних м'язів, судоми всього тіла, "сардонічна посмішка", опістотонус. Що з хворим?

- A** *Правець
- B** Інфікована рана
- C** Сказ
- D** Газова гангрена
- E** Гнилісна інфекція

18

В офтальмологічне відділення поступає пацієнт з ознаками гострого приступу глаукоми. Медсестра повинна виконати наступні лікарські призначення:

- A** *Закапувати 1% пілокарпін кожні 15 хвилин впродовж години
- B** Закапати 1% атропін, 0,25% скополамін, 1% гоматропін
- C** Закапати 30% сульфацил натрію, 0,25% левоміцетин
- D** Закласти за повіку тетрациклінову або левоміцетинову мазь
- E** Закапати дексаметазон, дексазон або гідрокортизон

19

На прийомі в офтальмолога пацієнт з ознаками лусочкового блефариту. Реалізуючи IV етап медсестринського процесу медсестра повинна:

- A** *Обробити краї повік діамантовим зеленим
- B** Обробити краї повік розчином дімедролу
- C** Обробити краї повік розчином анальгіну
- D** Обробити краї повік розчином дексаметазону
- E** Обробити краї повік розчином атропіну

20

Пацієнт, який впродовж 5 років працює на пиломілі, звернувся зі скаргами на зниження слуху, шум у вусі. Медсестра повинна підготувати пацієнта до:

- A** *Аудиометрії
- B** Отоскопії
- C** Діафаноскопії
- D** Рентгенографії вуха
- E** Вестибулометрії

21

Жінку доставлено у відділення реанімації з ознаками отруєння чадним газом. Пацієнтку терміново готують до проведення:

- A** *Гіпербаричної оксигенації
- B** Ентеросорбції
- C** Форсованого діурезу
- D** Гемосорбції
- E** Плазмаферезу

22

Після випадкового вживання невідомої рідини пацієнт скаржиться на біль в животі та гомілкових м'язах, порушення зору, блювання. Артеріальний тиск знижений, розвивається гіпертонус м'язів. Такі симптоми характерні для отруєння:

- A** *Метанолом
- B** Етанолом
- C** Опіатами
- D** Фософорорганічними сполуками
- E** Ацетатною кислотою

23

До лікаря звернулася пацієнтка зі скаргами на виділення крові із соска при натисканні на праву молочну залозу. До якого обстеження з метою уточнення діагнозу медична сестра підготує пацієнтку?

- A** *Мамографії
- B** Томографії
- C** Сцинтиграфії
- D** Ангіографії
- E** Сонографії

24

Ефективність зовнішнього масажу серця по пульсу на сонній артерії потрібно перевіряти кожних:

- A** *2 хв.
- B** 3 хв.
- C** 5 хв.
- D** 8 хв.
- E** 10 хв.

25

Невідкладна допомога при нирковій колиці:

- A** *Введення баралгіну
- B** Холод на поперек
- C** Назначення діуретиків
- D** Введення натрію хлориду
- E** Введення глюкозидів

26

Найбільш інформативний метод діагностики виразкової хвороби шлунка:

- A** *Фіброгастроскопія
- B** Рентгеноскопія
- C** Лапароскопія
- D** УЗД
- E** Сканування

27

Збільшення діастази сечі характерно для:

- A** *Гострого панкреатиту
- B** Гострого апендициту
- C** Защемленої грижі
- D** Проривної виразці шлунку
- E** Для інвагинації

28

При гострій затримці сечі в післяопераційному періоді використовують:

- A** *Катетеризацію сечового міхура
- B** Холод на лоно
- C** Внутрішньовенно глюкозу
- D** Внутрішньовенно натрію хлорид 10%
- E** Внутрішньовенно еуфілін

29

Можливі ускладнення при тромбофлебіті нижніх кінцівок:

- A** *Тромбоемболія
- B** Беших
- C** Слоновість
- D** Остеомієліт
- E** Періостит

30

Симптом “переміжної кульгавості” характерний для захворювання:

- A** *Облітеруючий ендартеріт
- B** Флеботромбоз
- C** Флебит
- D** Ревматоїдний артрит
- E** Тромбофлебіт

31

Перша допомога при відкритому пневмотораксі:

- A** *Накладання оклюзійної пов'язки
- B** Дренаж по Суботіну
- C** Протикашлеві препарати
- D** Плевральна пункція
- E** Введення наркотиків

32

До передракових захворювань прямої кишки відноситься:

- A** *Поліпоз прямої кишки
- B** Парапроктит
- C** Хронічний коліт
- D** Сигмоїдит
- E** Випадіння прямої кишки

33

Що характерне для перфоративної виразки 12-палої кишки?

- A** *Раптовий “кинджальний біль”
- B** Оперізуючий біль
- C** Симптом Пастернацького
- D** Блювання “кавовою гущею”
- E** Метеоризм

34

Лікворея виникає при:

- A** *Переломі основи черепа
- B** Забої головного мозку
- C** Пораненні склепіння черепа
- D** Струсі головного мозку
- E** Здавленні головного мозку

35

Хворий скаржиться на біль в оці і відповідній половині голови, значне зниження зору, нудоту, блювання. Внутрішньоочний тиск - 60 мм рт.ст. Відображена картина дозволяє запідозрити:

- A** *Гострий напад глаукоми
- B** Гострий іридоцикліт
- C** Повзучу виразку рогівки
- D** Метагерпетичний кератит
- E** Кератокон'юнктивіт

36

Хворий знаходиться на диспансерному обліку з приводу глаукоми. Яким методом можна визначити рівень внутрішньоочного тиску?

- A** *Тонометрії
- B** Візометрії
- C** Периметрії
- D** Кампіметрії
- E** Офтальмоскопії

37

У хворого проникаюче поранення ока. Профілактику якого захворювання Вам необхідно провести?

- A** *Правця
- B** Чуми
- C** Бешихи
- D** Сифілісу
- E** Токсоплазмозу

38

Пацієнту з відкритим переломом стегна, ускладненим артеріальною кровотечею, наклали джгут, ввели знеболюючі препарати. Що буде наступним етапом у веденні пацієнта?

- A** *Накладання захисної асептичної пов'язки на рану
- B** Госпіталізація хворого у травматологічне відділення
- C** Холод на місце травми
- D** Імобілізація пошкодженої кінцівки
- E** Надання хворому зручного положення

39

Утопленого чоловіка 48 років доставили на берег через 6 хвилин після утоплення.

Свідомість відсутня, пульс не визначається. Почали серцево-легеневу реанімацію: ШВЛ методом "з рота в рот" і масаж серця. Яка з перелічених ознак вказує на ефективність реанімаційних заходів?

- A** * Звуження зіниць
- B** Підвищення артеріального тиску
- C** Прискорення пульсу

D Сповільнення пульсу, часте дихання

E Прискорення дихання