

Крок М Сестринська справа
Невідкладні стани в терапії

1

У хворого астматичний статус. Який препарат Ви використаєте на долікарському етапі?

- A** *Преднізолон
- B** Дібазол
- C** Інсулін
- D** Пеніцилін
- E** Анальгін

2

У хворого після ін'єкції антибіотика виник анафілактичний шок. Що Ви використаєте при наданні невідкладної допомоги?

- A** *Адреналін
- B** Анальгін
- C** Дібазол
- D** Но-шпу
- E** Дицинон

3

Медсестра під час проведення шлункового зондування тонким зондом помітила у шлунковому вмісті значну кількість крові. Які її першочергові дії?

- A** *Припинити зондування
- B** Продовжити зондування
- C** Зробити перерву
- D** Поставити грілку на живіт
- E** -

4

У хворого критичне зниження температури тіла, з'явилися ознаки гострої судинної недостатності. Яке залежне сестринське втручання виконаєте при наданні допомоги?

- A** *Ввести судинні засоби
- B** Покласти грілки до ніг
- C** Дати випити каву
- D** Підняти ніжний кінець ліжка
- E** Забрати подушку з-під голови

5

Під час внутрішньовенного введення ліків у хворого з'явилися ознаки анафілактичного шоку. Надання допомоги необхідно розпочати з:

- A** *Накладання джгута на кінцівку
- B** Введення адреналіну підшкірно
- C** Подачі кисню
- D** Введення еуфіліну внутрішньовенно
- E** Введення преднізолону внутрішньовенно

6

У кардіологічне відділення терміново госпіталізований пацієнт з діагнозом: гострий інфаркт міокарда. Йому проводиться комплекс інтенсивної терапії та догляду. При плануванні заходів медсестринської допомоги пацієнту Вашим першочерговим завданням буде:

- A** *Забезпечити повний фізичний та психічний спокій
- B** Забезпечити комплекс гігієнічних заходів догляду за шкірою
- C** Спостереження за пульсом, артеріальним тиском
- D** Годування пацієнта та догляду за порожниною рота

E Слідкувати за фізіологічними відправленнями

7

На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 33 років з приводу бронхіальної астми. Яке медсестринське втручання необхідно здійснити у разі нападу бронхіальної астми:

- A** *Заспокоїти пацієнта, застосувати інгаляційно сальбутамол
- B** Заспокоїти пацієнта, дати зволожений кисень
- C** Заспокоїти пацієнта, поставити міхур з льодом на грудну клітку
- D** Заспокоїти пацієнта, дати відхаркувальну мікстуру
- E** Заспокоїти пацієнта, провести лужну інгаляцію

8

На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 42 років з діагнозом: нирковокам'яна хвороба. У нього раптово виник напад ниркової кольки. Яким буде першочергове незалежне втручання, спрямоване на зменшення болю:

- A** *Дасте теплу грілку на поперекову ділянку
- B** Введете спазмолітики за призначенням
- C** Дасте випити гарячого чаю
- D** Запропонуєте інтенсивні рухові вправи
- E** Поставите міхур з льодом на поперекову ділянку

9

Пацієнту на цукровий діабет медсестра за призначенням лікаря ввела 24 одиниці інсуліну. Через 20 хв. він звернувся до неї зі скаргами на відчуття сильного голоду, тремтіння кінцівок і всього тіла. Шкіра бліда, вкрита холодним потом. Яку термінову допомогу потрібно надати пацієнту:

- A** *Випити солодкого чаю
- B** Укласти в ліжку, зігріти
- C** Прийняти заспокійливі
- D** Прийняти цукрознижуючі
- E** -

10

Пацієнт звернувся до сімейної медсестри зі скаргами на сильний біль голови у потилиці, шум у вухах. Такі напади спостерігаються після психічних навантажень. АТ коливається від 150/100 до 190/110 мм рт.ст. Розвиток якого синдрому спостерігається у хворого?

- A** *Гіпертензивного
- B** Гострої серцевої недостатності
- C** Вінцевої недостатності
- D** Гіпотензивного
- E** Гострої судинної недостатності

11

Сімейну медсестру викликали до хворого 48 років, який скаржиться на біль тиснучого характеру за грудиною, що віддає у ліву руку. Біль з'явився після підняття по сходах. Який засіб слід використати в першу чергу?

- A** *Нітрогліцерин
- B** Ніфедипін
- C** Аспірин
- D** Атенотол
- E** Папаверин

12

Пацієнта доставлено в приймальне відділення без свідомості. Впродовж 8 років хворіє на цукровий діабет, отримує інсулін. На роботі втратив свідомість. Об'єктивно: шкіра чиста, волога, гіпертонус м'язів. АТ - 115/70 мм рт.ст. Яке ускладнення основного

захворювання виникло у пацієнта?

- A** *Гіпоглікемічна кома
- B** Гіперосмолярна кома
- C** Молочнокисла кома
- D** Гіперглікемічна кома
- E** Церебральна кома

13

В маніпуляційному кабінеті після введення антибіотика внутрішньом'язово у пацієнта з'явилися шум в вухах, почуття задухи, втрата свідомості. Яке ускладнення запідозрити медична сестра?

- A** *Анафілактичний шок
- B** Непритомність
- C** Колапс
- D** Кардіогенний шок
- E** Токсико-інфекційний шок

14

У хворого 65-ти років на рак легенів виникла легенева кровотеча. Який з перерахованих препаратів слід ввести?

- A** *Амінокапронову кислоту
- B** Анальгін
- C** Адреналін
- D** Гемостимулін
- E** Вітамін В₁₂

15

Пацієнтка доставлена бригадою швидкої допомоги у терапевтичне відділення зі скаргами на блювання темно-коричневого кольору, дьогтеподібні випорожнення, біль у животі, серцебиття, загальну слабкість. Страждає на виразкову хворобу шлунка. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- A** *Шлункова кровотеча
- B** Легенева кровотеча
- C** Гемороїдальна кровотеча
- D** Стравохідна кровотеча
- E** Маткова кровотеча

16

Жінку укусила бджола в праве плече. Вона звернулася до медичної сестри зі скаргами на набряк, свербіння у місці укусу. Яку невідкладну допомогу треба надати хворій?

- A** *Накласти міхур з льодом
- B** Накласти пов'язку з фурациліном
- C** Ввести р-н анальгін
- D** Обробити розчином йоду
- E** Прикласти грілку до місця укусу

17

У хворої, яка страждає на гіпертиреоз, після психоемоційної травми з'явилися різке збудження, профузна пітливість, висока температура тіла (41°C), тахікардія, АТ - 160/70 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у пацієнтки?

- A** *Тиреотоксична криза
- B** Гіпертонічна криза
- C** Порушення мозкового кровообігу
- D** Напад серцевої астми
- E** Напад стенокардії

18

У пацієнта на гіпертонічну хворобу ввечері раптово підвищився артеріальний тиск. З'явився біль в ділянці серця і потилиці, миготіння “мушок” перед очима, нудота. Об'єктивно: АТ - 260/100 мм рт.ст. Пульс – 120/хв., ритмічний. Обличчя гіперемійоване, шкіра волога. Яке ускладнення виникло?

- A** *Гіпертонічна криза
- B** Стенокардія
- C** Гостре порушення мозкового кровообігу
- D** Інфаркт міокарду
- E** Гостра лівошлуночкова недостатність

19

У пацієнтки на цукровий діабет з'явилась слабкість, зниження працездатності, погіршення апетиту, спрага, сонливість, шумне дихання Куссмауля, запах ацетону з рота. Через 2 доби втратила свідомість. АТ - 100/60 мм рт.ст. Пульс – 110/хв., ритмічний. Шкіра суха. Очні яблука м'які, зіниці звужені. Яке ускладнення виникло у хворої?

- A** *Гіперглікемічна кома
- B** Гіперсмолярна кома
- C** Гіпоглікемічна кома
- D** Уремічна кома
- E** Печінкова кома

20

У пацієнта на гіпертонічну хворобу після стресу ввечері з'явилась різка слабкість, біль в ділянці серця з ірадіацією в ліве плече і руку впродовж 30 хвилин, не знімається нітрогліцерином. Об'єктивно: блідий, АТ - 90/60 мм рт.ст. Пульс - 90/хв., аритмічний. Що запідозрить медична сестра?

- A** *Інфаркт міокарду
- B** Шок
- C** Колапс
- D** Серцеву астму
- E** Стенокардію

21

В гастроентерологічному відділенні у пацієнта на виразкову хворобу шлунка раптово вночі з'явився “кинджальний” біль у надчеревній ділянці. Об'єктивно: холодний липкий піт, блідість шкіри. Захисне напруження м'язів передньої черевної стінки, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

- A** *Перфорація
- B** Пенетрація
- C** Пілоростеноз
- D** Малігнізація
- E** Шлункова кровотеча

22

Під час прогулянки в полі чоловіка вкусила оса. Невдовзі він поскаржився на біль в гортані, охриплість голосу, утруднене дихання, нудоту. Об'єктивно: набряк губ, язика, мигдаликів, повік. Дихання шумне. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A** *Набряк Квінке
- B** Гострий риніт
- C** Анафілактичний шок
- D** Кропив'янка
- E** Астматичний статус

23

Пацієнт 42 років звернувся до чергової медичної сестри онкологічного диспансеру з

такими проблемами: кашель з виділенням яскраво-червоної крові, запаморочення.
Який препарат підготує медсестра для надання допомоги?

- A** *Дицинон
- B** Диклофенак
- C** Дипіридамо́л
- D** Димедрол
- E** Дилтіазем

24

Пацієнт 53 років звернувся до дільничної медсестри зі скаргами на стискаючий біль за грудиною, який триває 4-5 хвилин та іррадіює в ліве плече, ліву руку. Який препарат застосовують з метою розширення коронарних артерій?

- A** *Нітрогліцерин
- B** Нітроксолін
- C** Димедрол
- D** Омнопон
- E** Папаверин

25

Пациент, 42 года, жалуется на резкие боли за грудиной, которые иррадируют в левую руку. Приступ длится более 30 минут, применение нитроглицерина эффекта не дало. Для какого заболевания характерны такие проблемы пациента?

- A** *Инфаркт миокарда
- B** Приступ стенокардии
- C** Отек легких
- D** Гипертонический криз
- E** Порок сердца

26

Пациент, 34 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом - язвенная болезнь желудка. Жалуется на слабость, головокружение, рвоту "кофейной гущей", дегтеобразный кал. Какое осложнение возникло у пациента?

- A** *Желудочно-кишечное кровотечение
- B** Перфорация язвы
- C** Пенетрация
- D** Малигнизация
- E** Стеноз привратника

27

Пациент, 22 года, находится на лечении в пульмонологическом отделении с диагнозом - бронхиальная астма. Возник приступ удушья с затрудненным выдохом, кашель со стекловидной мокротой. Какой препарат необходимо приготовить медсестре для оказания неотложной помощи?

- A** *Эуфиллин
- B** Кордиамин
- C** Анальгин
- D** Коффеин
- E** Дибазол

28

Медсестру пригласили к соседу, 54 года, страдает сахарным диабетом. Со слов родственников жаловался на слабость, чувство голода, дрожание тела, головокружение. Затем потерял сознание. Объективно: кожа бледная, влажная, тонус мышц повышен, дыхание поверхностное, глазные яблоки обычные, запаха ацетона нет. Какое состояние возникло у пациента?

- A** *Гипогликемическая кома
- B** Гипергликемическая кома

- C* Уремическая кома
- D* Печеночная кома
- E* Анафилактический шок

29

Больная К., 47 лет, находится на лечении с диагнозом - язвенная болезнь желудка. Внезапно возникла резкая "кинжальная" боль в эпигастриальной области, слабость, головокружение. Тактика медсестры в данной ситуации?

- A* *Вызвать врача
- B* Ввести анальгин
- C* Ввести спазмолитики
- D* Промыть желудок
- E* Дать теплое питье

30

Больной доставлен в приемное отделение без сознания, кожа и слизистые сухие, гиперемия щек, изо рта запах ацетона. В анамнезе - сахарный диабет. Какой препарат медсестра подготовит для введения?

- A* *Инсулин
- B* Глюкоза 20%
- C* Глюкоза 40%
- D* Глюкагон
- E* Строфантин

31

У пациента онкодиспансера спостерігається виділення під час кашлю червоної пінистої крові. Протягом останніх двох місяців погіршився апетит, з'явилася слабкість, знизилася маса тіла. Об'єктивно: шкіра бліда, пульс - 100/хв., АТ - 80/50 мм рт.ст. В аналізі мокротиння виявлені атипів клітини. Яку долікарську допомогу необхідно надати пацієнту в першу чергу?

- A* *Покласти міхур з льодом на грудну клітку
- B* Покласти теплу грілку на грудну клітку
- C* Поставити гірчичники на стегно
- D* Провести оксигенотерапію
- E* -

32

У пацієнта після вживання меду з'явилися скарги на різке нездужання, утруднене дихання, осиплість голосу. Під час огляду: стан середньої тяжкості, свідомість збережена. Шкірні покриви бліді, набряклі губи, повіки та язик. Пульс - 92/хв., АТ - 110/70 мм рт.ст. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A* *Набряк Квінке
- B* Кропив'янка
- C* Сироваткова хвороба
- D* Напад бронхіальної астми
- E* Анафілактичний шок

33

У пацієнтки 54 р., яка хворіє на цукровий діабет, раптово появились загальна слабкість, відчуття голоду, тремтіння тіла, запаморочення, втрата свідомості. Який із препаратів медсестра повинна підготувати?

- A* *40% розчин глюкози
- B* 0,9% розчин хлориду натрію
- C* Інсулін
- D* Кордіамін
- E* Строфантин

34

У хворого після введення пеніциліну раптово з'явилися різка слабкість, запаморочення, відчуття страху, ядуха, стиснення в грудній клітці, біль у животі. Стан хворого важкий. Шкіра бліда, волога. Пульс ниткоподібний, гіпотонія. Які першочергові дії медсестри?

- A** *Місце ін'єкції обколоти 0,1% розчином адреналіну гідрохлориду
- B** Ввести еуфілін
- C** Ввести 20% розчин кофеїну
- D** Покласти грілку
- E** Ввести строфантин

35

Хвора скаржиться на інтенсивний тиснучий біль за грудиною, що триває 45 хв., слабкість, серцебиття, страх смерті. Об'єктивно: шкіра бліда, синюшність губ. Тони серця ослаблені, ритмічні. Пульс - 108/хв., АТ - 100/60 мм рт.ст. Яке захворювання запідозрить медсестра?

- A** *Гострий інфаркт міокарда
- B** набряк легень
- C** Стенокардія
- D** Міокардит
- E** Сухий плеврит

36

У пацієнтки після введення протиправцевої сироватки через декілька хвилин з'явилась різка кволість, запаморочення, серцебиття, задишка. Пізніше втратила свідомість. Об'єктивно: виражена блідість шкіри та слизових, пітливість. Ps - 110/хв., АТ - 60/40 мм рт.ст. Вкажіть причину погіршення стану пацієнтки?

- A** *Анафілактичний шок
- B** Астматичний статус
- C** Травматичний шок
- D** Геморагічний шок
- E** -

37

Пацієнтка скаржиться на поширену висипку на шкірі, яка супроводжується нестерпним свербіжем. Висипка з'явилась на другий день після щеплення протигрипозною вакциною. Об'єктивно: стан задовільний. На шкірі обличчя, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок - поширене уртикарне висипання, місцями зливного характеру, сліди від розчухів. Міхурі рожево-червоного кольору, підвищуються над рівнем шкіри. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- A** *Гостра кропив'янка
- B** Вітряна віспа
- C** Системний червоний вовчак
- D** набряк Квінке
- E** Скарлатина

38

Пацієнт доставлений в лікарню у тяжкому стані, свідомість сплутана. Шкіра суха, запах ацетону в повітрі. Пульс - 115/хв., ритмічний, АТ - 95/65 мм рт.ст. Дихання шумне, типу Кусмауля. До якого найбільш інформативного методу дослідження підготує медична сестра пацієнта?

- A** *Визначення рівня глюкози в крові
- B** Визначення вазопресину в крові
- C** Визначення креатиніну крові
- D** Визначення рівня білірубину
- E** Визначення рівня рН крові

39

Хворий 55 років скаржиться на біль за грудиною після психічного навантаження.

Встановлено діагноз стенокардія. Виберіть препарат надання невідкладної допомоги:

- A** *Нітрогліцерин
- B** Гепарин
- C** Вікасол
- D** Клофелін
- E** Преднізолон

40

Визначте невідкладну допомогу при перфорації виразки шлунку:

- A** *Міхур з льодом
- B** Антибіотики
- C** Кровоспинні засоби
- D** Постільний режим
- E** Введення наркотиків

41

У пацієнта 60 років з цукровим діабетом виникли такі симптоми: спрага, сонливість, запах ацетону з рота. Для надання невідкладної допомоги необхідно ввести:

- A** *Інсулін
- B** Глюкозу
- C** Папаверин
- D** Дібазол
- E** Димедрол

42

Під час відвідування вагітної на дому в терміні вагітності 34 тиж. патронажна медсестра встановила наявність незначних кров'янистих виділень зі статевих шляхів, які з'явилися раптового серед повного благополуччя. Які першочергові заходи повинна здійснити медсестра?

- A** *Викликати лікарську акушерську бригаду.
- B** Покласти міхур з льодом на живіт
- C** Ввести розчин вікасолу.
- D** Виміряти АТ.
- E** Зробити тампонаду піхви.

43

Під час нічного чергування медсестру покликали до хворої на цукровий діабет, яка втратила свідомість і розпочалися судоми. При огляді звертає на себе увагу профузна пітливість, тахікардія. Про який стан слід подумати медсестрі?

- A** *Гіпоглікемічна кома
- B** Кетоацидотична кома
- C** Гіперосмолярна кома
- D** Гіперлактатацидотична кома
- E** Тиреотоксична кома

44

До хворої 35 років, яка 8 років лікується з приводу бронхіальної астми, на виклик прибула медична сестра. Зі слів хворої, протягом останніх двох днів у неї почастишали напади ядухи з утрудненим видихом. Інгаляції беротека, які завжди допомагали їй, перестали знімати напад ядухи, який триває вже 3 години. Яке ускладнення бронхіальної астми у хворої?

- A** *Астматичний статус
- B** набряк легенів
- C** Легенева кровотеча
- D** Легеново-серцева недостатність
- E** Серцева астма

45

Хворому з набряком легень надають сидячого або напівсидячого положення із спущеними додолу ногами з метою:

- A** *Зменшити приплив венозної крові до серця
- B** Зменшити набряки на ногах
- C** Збільшити кровопостачання головного мозку
- D** Зменшити артеріальний тиск
- E** Покращити функцію нирок

46

Пацієнта на цукровий діабет вранці не змогли розбудити. При обстеженні: сухість шкіри, знижений тонус м'язів, запах ацетону, дихання шумне, глибоке. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A** *Діабетична кома
- B** Гіпоглікемічна кома
- C** Печінкова кома
- D** Уремична кома
- E** Гіпотиреоїдна кома

47

У пацієнта на бронхіальну астму почався сухий кашель, дихання утруднилось, видих здійснюється зі свистом і чути на відстані. Який препарат потрібно приготувати медичній сестрі для надання невідкладної допомоги?

- A** *Розчин еуфіліну
- B** Розчин строфантину
- C** Розчин корглікону
- D** Розчин дибазолу
- E** Розчин гентаміцину

48

Ви працюєте медсестрою в протитуберкульозному диспансері. У хворого почалась легенева кровотеча. Приготуйте кровоспинний препарат:

- A** *Дицинон
- B** Делагіл
- C** Дроперідол
- D** Допегід
- E** Діонін

49

У хворого ниркова колька. Яку долікарську допомогу може надати медсестра?

- A** *Грілка на поперекову ділянку
- B** Міхур з льодом на поперекову ділянку
- C** Зігрівальний компрес на поперекову ділянку
- D** Ввести розчин анальгіну в/м
- E** -

50

Пацієнт знаходиться в палаті інтенсивної терапії з приводу гострого інфаркту міокарда.

При догляді за пацієнтом в перші години необхідно:

- A** *Забезпечити фізичний і психічний спокій
- B** Поставити очисну клізму
- C** Провести дихальну гімнастику
- D** Помістити хворого в гарячу ванну
- E** Надати положення ортопное

51

У пацієнта виник напад бронхіальної астми. Який лікарський засіб підготує медсестра для надання невідкладної допомоги?

- A** *Астмопент
- B** Дібазол
- C** Строфантин
- D** Фуросемід
- E** Контрикал

52

У хворого на цукровий діабет розвинулась гіпоглікемічна кома. Який лікарський препарат приготує медсестра в першу чергу?

- A** *Глюкозу
- B** Папаверин
- C** Анальгін
- D** Дібазол
- E** Інсулін

53

У пацієнта за 2 години температура знизилась від 40°C до 36°C. Пацієнт блідий, вкритий холодним потом, тахікардія, гіпотензія. Які дії медичної сестри до приходу лікаря?

- A** *Надати горизонтальне положення з піднятим нижнім кінцем, грілки до кінцівок
- B** Надати високе положення Фаулера, гірчичники на литкові м'язи
- C** Надати сидячєе положення, гарячі ніжні ванни
- D** Надати середнє положення Фаулера, грілки до кінцівок
- E** Надати горизонтальне положення, гірчичники на литкові м'язи

54

У пацієнта під час фізіопроцедури раптово виник напад стенокардії. Яка першочергова дія медсестри?

- A** *Припинити фізіопроцедуру
- B** Визначити частоту дихання
- C** Визначити АТ
- D** Визначити показники пульсу
- E** Продовжити фізіопроцедуру

55

У пацієнта на гострий інфаркт міокарда розвивається набряк легенів. Яка першочергова дія медсестри?

- A** *Надати напівсидячого положення з опущеними ногами
- B** Надати положення з опущеною головою
- C** Надати горизонтального положення з піднятими ногами
- D** Надати сидячого положення
- E** Надати положення на боці

56

Пацієнтка лікується з приводу цукрового діабету. Поскаржилася медсестрі на відчуття голоду, слабості, тремтіння рук. Якою буде першочергова дія медсестри?

- A** *Дати солодкий чай або цукор
- B** Ввести розчин глюкози 5%
- C** Ввести розчин глюкози 20%
- D** Ввести інсулін короткої дії
- E** Ввести інсулін пролонгованої дії

57

У пацієнта на хронічний гломерулонефрит піднявся АТ до 190/110 мм рт.ст. Яке незалежне втручання виконає медична сестра?

- A** *Гірчичники на потиличну ділянку
- B** Грілку на поперекову ділянку
- C** Міхур з льодом на потиличну ділянку
- D** Гарячу ванну
- E** Гірчичники на ділянку серця

58

У пацієнта на бронхіальну астму медична сестра виявила скарги: задишку з утрудненим видихом, напади кашлю з незначною кількістю харкотиння, відчуття стискання в грудях.

Вкажіть залежне медсестринське втручання:

- A** *Ввести адреналін
- B** Забезпечити доступ свіжого повітря
- C** Звільнити пацієнта від стискаючого одягу
- D** Забезпечити пацієнта плювальницею
- E** Підрахувати частоту дихальних рухів

59

Хворий на цукровий діабет втратив свідомість. Медсестра запідозрила гіпоглікемічну кому. Які клінічні симптоми свідчать про цей патологічний стан?

- A** *Волога шкіра, тонічні та клонічні судоми
- B** Запах ацетону з рота, сухий малиновий язик
- C** Повільне, шумне дихання
- D** Сухість шкіри, діабетичний рум'янець
- E** Знижений тонус очних яблук та м'язів

60

У хворого на абсцес легенів виражена гіпертермія: $t^{\circ} - 39,6^{\circ}\text{C}$. Яке незалежне втручання медичної сестри направлене на зниження температури тіла?

- A** *Холодний компрес на чоло
- B** Гарячий чай з малиною
- C** Тепле укутування
- D** Грілки до нижніх кінцівок
- E** Введення кордіаміну